

Parâmetro	Valor/Descrição
Total de pacientes avaliados	146
Pacientes incluídos na análise	9
Diagnóstico	- PVM isolado: 5 (55,6%) - PVM + DAM: 3 (33,3%) - DAM isolada: 1 (11,1%)
Idade média (anos)	52
Sexo	- Masculino: 6 (66,7%) - Feminino: 3 (33,3%)
Sintomas	- Palpitações: 6 (66,7%) – - Assintomáticos: 2 (22,2%) - Cansaço: 1 (11,1%)
Função Ventricular (FEVE)	Preservada (100%)
Insuficiência Mitral	Leve/ausente (exceto 1 paciente com troca valvar prévia)
Indicações para ablação	- Extrassístoles ventriculares sintomáticas: 2 - Taquicardia ventricular (TV) não sustentada ou sustentada: 6 (incluindo 2 suspeitas de TV fascicular) - ICD por TV instável: 1
Achados de indução de arritmia	- Sem indução: 3 (33,3%) - Origem no summit do VE: 2 (22,2%) - Origem nos papilares póstero-septal e ínfero-medial: 2 (22,2%) - Arritmia fascicular: 1 (11,1%) - Seio de Valsalva: 1 (11,1%)
Necessidade de segundo procedimento	5 (55,6%)
Seguimento médio	18 meses
Morte súbita	0

Tabela 1. Características dos Pacientes e Achados do Estudo